

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷八十二

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官助教臣羅萬選

謄錄監生臣姚培雯

欽定四庫全書

證治準繩卷八十二

明 王肯堂 撰

幼科

心臟門

榮枯

夫物濕則潤澤燥則乾枯榮枯之分血實主之故血者所以營陰陽濡皮毛流關節也瘡本疎者血不在多而

易充足瘡本稠密貴乎血之有餘矣苟血有餘則經脈流行淪於肌膚浹於皮毛灌溉滋潤肥澤長養自然形色鮮明根窠紅活也如血不足則經脈壅遏窠囊空虛黑燥而不鮮明也枯萎而不肥澤也皮膚皴揭而啟裂也經曰諸澀枯涸乾勁皴揭皆屬於燥又曰燥勝則乾由其人血常不足加之毒火熏灼反兼燥金之化精血並竭是以有此證也法宜活血養液散熱毒清金潤燥則乾涸可回觀夫蒼之榮枯而得養血之理其或

濕氣太過瘡本浸淫犯之則破潰爛難靨者此又火極而兼水化也脾強則生脾弱則死

標本

病有標本治有先後有從標者有從本者有先標後本者有先本後標者有標本兼治者視其緩急不可膠柱而鼓瑟也痘瘡之候自人身而言氣血為本瘡疹為標自瘡疹而言瘡疹為本別證為標如瘡子稠密在標之病也視其氣之不勻血之不周以勻氣活血兼行解毒

此則標本兼治也瘡若起發氣或虛者補其氣血或虛者補其血此緩則治其本也氣血充實瘡或壅遏者單行托裡解毒之劑此急則治其標也瘡勢太甚咽喉腫痛者以治咽喉為主此急則治其標也瘡勢太甚自利不止者以治利為主此急則治其標也利久不止漸成壞證救裡發表兼而行之此亦標本兼治也先救其裡後攻其表此則先標後本也大小便秘煩燥喘呼者急利之此急則治其標也瘡勢太甚煩渴不止以解毒為

主兼治其渴此先本而後標也凡此之類擴而充之以盡其餘則治不素矣

始終

治痘之法貴乎謹之於始而慮其所終庶無後日之悔
經曰上工治未病中工治將病下工治已病未病施治
十全八九治將病者十全四五治已病者功莫能施發
熱之初大熱渴煩大便秘腹痛腰痛鼻乾唇燥驚悸譫
妄此毒氣鬱遏於內即當防其伏而不出也吐利不止

即防其中氣虛弱不能助瘡成就或致倒陷也故熱則解之便秘則利之驚則平之吐利則止之且如初出一點血此春之氣發生之令也至於起發此夏之氣長養之令也水化為漿此秋之氣成實之令也膿乾結靨此冬之氣閉藏之令也初出而便有水將發而便戴漿膿未成而便收靨此未至而至謂之太過必有陷伏發表托裏解毒切不可緩應出不出應起不起應收不收此至而不至謂之不及必責以氣衰血微而勻氣活血解

毒之法不可不急施也又如初出色艷者皮嫩皮嫩則易破當防其癢塌也相聚成塊者不可謂之疎此有伏也殼空無水者後必發癰頭面預腫者防其易消而倒陷咽痛者急解之防其失聲嗆喉也中多水疱者後必自利目澀淚出者防其有膚醫也頻更衣者防其倒靨瘡破不結痂此倒靨也堯夫云與其病後纔服藥孰若病前能自防其此之謂歟

指南云氣色白也血色紅也痘毒初出之際血氣未定吉

凶未兆而紅白之形色未分見於腮耳口鼻年壽之間
一點淡紅而已既而其中稍有微白而外則淡紅如故
也至此而吉凶已判矣既而根窠圓混而其中之白漸
大而外之淡紅漸細至此吉凶悔吝之機著矣既而其
痘形色尖圓光澤中之白色遂充而外之紅暈漸細痘
至於此始有成漿之意其中白色略帶微黃而又紅活
也進而五六日之中內之白色雖將變黃猶未離於紅
白之間也外之紅圈雖將漸細而尚未至於微也進而

六日七日則中之白色變而純黃猶未至於老也外附紅暈微有一線紅潤光潔之色而已既而八日九日之中則痘成漿圓潔飽滿有黃色而無紅暈至此血氣順序治定功成矣至十一十二日漸見乾黃或如青豆色氣血平復之時也雖然猶有倒靨之患未可忽也至十二十三日乾黃皮皺結成老靨自頭面而及手足者順也自手足而及頭面者逆也至十三十四日則靨老而落矣然猶有老而不落之患名曰漆面刺肉身體發熱眼

紅面赤心煩口渴者有矣面虛目腫惡心者有矣靨老而後從靨內潰爛者有矣身熱不退口生疳蝕舌生白胎者有矣或四肢發毒或發疔腫者有矣眼生白障或眼露白睛者有矣痘雖平復禍變百出烏得以靨老而不知防乎靨老脫却光潔治痘若愈矣然猶未也靨落而疤白者有矣有經月之餘而猶發寒熱者矣或生流注潰爛或生疥癩或發渴狂煩或喘渴不寧痂雖脫落餘證相仍死生未可保也治痘者又可以痂落為平安

哉

日數

汪前人謂小兒虛實不等不可拘以日數有熱三日而成癰有熱六七日而生癰者有至十餘日而生癰者但足上有癰為出齊出齊之後長成血泡血泡七日當結膿窠苟或血泡之中尚有紅癰點相夾而生則又不可拘以日數待其皆作血泡為齊血泡七日結膿窠此乃榮衛調和內外無諸感冒方能如期且如血泡正作之

際遇天冷寒暑燥濕風不節氣候異宜因而遲速失序
亦不可拘以日數但以紅點皆為血泡日為齊若出血
泡七日病人氣虛尚有紅點未能皆成血泡者為毒氣
彌盛而不斂急用豬尾膏則隨時結痂疔矣 萬世俗
謂幾日發熱幾日出形幾日起發幾日作漿幾日收靨
此大略之言耳痘有疎密毒有微甚人有虛實豈可一
切拘以日數如瘡本疎者其毒微其人中氣實又能食
自然易出易靨固不待於旬日者如瘡本密者其毒甚

其人中氣實又能食滌衛調和內外無諸傷犯至十二
三日可以刻期收靨也若其中氣虛食少或內外曾
有傷犯或遇氣候乖變因而難靨豈可必拘以日數哉
聞人氏云稟氣實者夏酷暑而不甚畏熱冬嚴寒而不
甚畏冷稟氣怯者易寒易熱天寒陰雨則感寒濕而濡
瀉天氣稍炎則伏熱而中暍是故先知節候者能辨陰
陽寒暑之盛衰經云陽盛人耐冬不耐夏陰盛人耐夏
不耐冬此亦知人稟受之不同且自立夏氣變純陽萬

物盛大治藥者用熱遠熱如桂枝麻黃之輩必加知母
升麻石膏等服之立冬氣合純陰治藥者用寒遠寒如
用諸涼劑中病即止不必盡劑又如冬溫煖則虛者安
而實者病夏寒涼則實者安而虛者病冬溫煖夏寒涼
非節之氣來暴而去速在人將攝之如何爾 如天大
寒蓋覆常宜溫煖勿使受寒恐毒氣為寒所觸而不得
出也如天大熱不可蓋覆却宜清涼勿使客熱與毒相
併致增煩躁使瘡潰爛也如時有迅雷烈風暴雨之變

宜謹幃帳添蓋覆多燒辟穢香以辟一時不正之氣
臥處常要無風又要通明切忌幽暗夜靜不斷燈火不
離親人看守恐要飲食一時得具或有癢痛與之撫摩
恐他人未必盡心如法也

聞人氏云木得桂則枯雌黃遇胡粉則黑柑得脯則壞
物之相畏有如此者痘瘡之畏穢惡雜氣其理亦如是
也 房中淫洩氣 婦人經候氣 狐臭漏腋氣 醉

酒葷穢氣 硫黃蚊藥氣 微爛蒸濕氣 誤燒油髮

氣 溼糞淋尿氣 熬油煎卵氣 一切腥臊氣 五
辛之氣 遠行染帶之氣 以上最宜避忌仍令人謹
伺門戶勿令生人輒入勿掃房室勿動溝渠勿啟溷廁
勿燒腦麝酷烈諸香 仲景云瘡痘欲出之間宜燒蒼
朮猪甲二物床帳左右前後宜掛胡荽以酒噴之或燒
乳香尤妙蓋榮衛得香則運行甚速可使瘡毒易出苟
防備一不如法則禍患踵至欲出者使之不出已出者
癰爛成片甚者瘡黑陷伏加以爛臭痛如刀刺悶亂而

死其中縱得安者亦令癰痕經年黑色反成疥癬不可
不戒 凡痘瘡初出即當禁戒房事室中常燒辟穢香
令煙不絕更多燒硬石以水澆之若有觸犯瘡或色變
或作癢者以茵陳熏法解之

辟穢香

灌漿

茵陳熏法

起發

袁治痘觸變焦紫方

痘觸變焦紫條時喘急起急覓絲瓜皮取末蜜調處
甘草地黃湯一服痘更起若加煩譊時犀角磨湯水

此是四五朝治觸當如此期若至七八空殼觸必死

漿半犯觸證按驗莫糊指

絲瓜皮須要看他未生筋之時取來燥乾臨用只可

取皮蒂為末

治觸變灰白痘方

痘觸變灰白梟癢恐不得附子兼黃耆愈多功愈特

助藥已脩前何須甚分悉憑君自攄奇奇處如應敵

此痘須詳察盤座有元紅則挽治得全若無真元根縷不必療治

治痘被月經觸癢方

痘正凶凶纔翕漿適為月水正當場不知淨潔相防
護致使花欄條變常月月紅花一樣樂不分枝葉取
煎湯嫩杪煎湯投酒服根枝濃沸活花郎不消時刻
還歸正任汝經紅觸滿床

治痘被麝觸癢方

麝香一觸癢難教點點花心帶黑椒急把升麻蒼耳
草濃煎漫浴轉明饒內托應須求衛氣參芪歸芍橘
甘遭生地防風蟬脫倍紅花赤豆共成標

詳考赤豆
非家種赤

小豆是生於山谷粒粗而扁越人取而鑲
嵌首飾色極紅美若無以家赤大豆代之

治痘被屍厭觸變方

死屍觸變目翻斜痘必沉潛吐沫加速把元荈併棗

艾為筒燒噴正靈家外取辰砂煮薑醴時時引呷振

欄花雖然屍厭未戕痘主此依然麗美艷

遇治此痘
宜元荈和

辰砂薑酒服外燒其方藥而辰砂
性沉滯善能振痘不宜多服者也

治痘被客忤觸變方

客忤相侵似若驚啼號不歇面渾青絲爪細結含花

者露摘蒸來焙粉成見證蜜調多少服隨兒大小要
詳明此時莫說絲瓜賤一寸絲瓜一寸金

治痘被獸驚縮方

痘五六朝正要灌漿翕膿時候偶為猫犬諸獸驚嚇
而痘隨縮匿或色變為斜或形沉於底蓋心失其生
而血不能以歸輔氣弗協以充托也急服烏龍散

烏龍散方

烏龍散治痘中驚驚係猪猫犬馬形只求遠志菖蒲

等蟬脫須將水洗清再加醴酒頻頻煮去却菖蒲遠志們獨留蟬脫研為末砂糖調服酒含噙遠志淨一兩菖蒲淨細實者一兩和酒煮熟去二味蟬退焙為末將藥酒進服再投雞鳴散無不全美者矣

錢氏云凡瘡疹當乳母慎口不可令饑及受風冷聞人氏云凡人一日不食則饑觸風冷則病況小兒當瘡痘之際正欲賴穀氣以助其內避風寒以護其外苟穀氣虧少風寒侵襲則為患可勝言哉乳下嬰兒宜常令其

母飲食充足居處避風能食童子專令老成耐事人時
時管顧雖然事亦貴得其平或者以失饑冒風寒為戒
遂致過飽極溫非徒無益而又害之瘡痘之家宜備知
之 陳氏云痘瘡發熱口乾煩渴不止者切不可與水
喫亦不宜與蜜红柿西瓜橘子等冷物食之若脈實中
有實熱者不必忌生冷 痘瘡欲靨已靨之間忽不能
靨腹脹煩渴不可與水蜜等冷物食之或頭溫足指冷
或瀉渴氣促亦不可與之十二日十三日瘡痂已落其

癰猶黯或凹或凸肌肉尚嫩不可澡浴亦不宜食炙煨
物酸辣五辛有毒之物恐熱毒熏膈眼目多生醫障
海藏云世人徒知憐惜過愛信其俗而不藥病已成而
方憂撫摩從容無所不從豈知愛之適足以害之惜之
適足以棄之始不早治治不全終卒之殞斃勞而無功
至是咎醫嗚呼其計亦謬矣

汗下

錢氏云痘疹惟用溫平藥治之不可妄下及妄攻發

活人書云小兒瘡疹與傷寒相似頭痛身熱足冷脈數
疑似之間只與升麻湯解肌兼治瘡子已發未發皆可
服但不可疏轉此為大戒傷寒身熱固不可下瘡疹發
熱在表尤不可轉世人不學乃云初覺以藥利之宣其

毒也誤矣

海藏云此論雖當在經則可若熱甚過極足
冷或肉傷腹熱足冷宜以寒藥如洗心調胃

及化食藥通膈之類主之然當求責臟腑秘與不秘脈
道何如耳許氏云上熱下冷傷食也癰疹初熱手足亦
冷惟傷寒一身盡熱不與足冷相類此傷食非傷
冷也若傷冷不宜用玉德亭用感應丸以治之

痘

瘡已出不可疎轉出得已定膿血太盛却用疎利亦非

也

海藏云此言若在經而出不盡者為當若腹胃有垢臟便時後重如痢疾及脉滑在裡者亦當微下

大抵瘡疹首尾皆不可下

海藏云臟腑有凝滯者不可拘拘此也

小兒

身耳尻咳嗽輒用利藥即害人

海藏云此言裡和而少陽之氣在經熱者

故用化毒犀角湯為氣出裏若氣未出裡未盡求責疎利亦可

凡治疹痘纔瀉則令

內陷決不可輕易轉下惟大小便多日不利宜微微利

之及痘已靨尚有餘熱停留或作熱或作瘡痍或成癰

宜四順飲下之不特消餘毒亦免生他證累試累驗

每見疹痘者服發表麻黃藥出汗陽氣盡出膚表遂至

癰爛臟虛虛則腹痛自利或作寒戰或作陰癰死者多矣凡瘡疹證見及癰點既生若無內外寒熱虛實者但安養之任其自然則非惟不生他證亦易於調理今人則纔見癰點不顧所蘊輕重惟恐不出用藥表之服以紫草蟬退副以人齒猴梨併與酒麴芫荽無所不試曾不知毒氣遇發則一倍變為十倍十瘡合為一瘡名為癰爛五內七竅至於皆有則重者不救輕者為聲啞為目疾為癰爛為閉耳塞鼻之患又有過用表藥裡無

陽氣以應之為虛脫者多矣此妄表之過也大抵瘡疹已出正賴胃氣運其毒氣善攻其熱者熱甚則利小便蓋小便利則心火有所導引雖不用冷藥熱亦自減矣熱輕則解其熱蓋小熱不解大熱必生小熱而利其小便則慮損氣故但當解熱也利小便之藥導赤散為上解毒之劑如玳瑁湯獨勝散安斑散如聖散紫草湯犀角飲皆可選用昧者但言瘡疹是熱時進涼劑致胃氣轉虛令兒胸滿腹脹又且下之內虛毒入則殺人甚速

此不善下之過也。若小兒鼻塞唇焦，內伏熱也。脈細面
色痿黃，或青色，皮膚慢口吐青涎者，此誤下證也。或裏
無蘊熱，亦何可下？要之治熱以溫涼而行之，未至於冷
治寒以溫，未至於熱，當從其漸而已。潔古云：大凡癰
疹首尾皆不可下，恐動則生變。此謂少陽通表宜和之
也。當先安裡解毒，次微發之，解毒須安五臟，防風湯是
也。如大便不秘者，須微發之，藥宜錢氏方中選而用之。
如大便過秘，宜微利之，當歸丸、棗變百祥丸是也。初如

癰疹若使之併出小兒難禁是以別生他證也首尾不可下者首日上焦尾日下焦若既吐利安可下便宜安裏若不吐瀉者先與安裡藥三五服如能食而大便秘結內實者宜疎利之若內虛而利者宜用安裡藥一二服末後一服調以微發之藥要之安裡之藥多發表之藥少秘則微疎之令邪氣勿壅併而能作番次出使兒易禁也身溫者順身涼者逆二者宜多服防風湯和之

防風湯方
見大法

海藏云假令五日已裡諸病與癰疹不能

辨別者不可疑作癰疹必須發之但各從其所傷應見治之皆不妨癰出若強發之其變不可勝數矣前人言首尾俱不可下者為癰未顯於表下則邪氣不得伸越此脈證有表而無裡故禁首不可下也尾不可下者為癰毒已顯於外內無根蒂大便不實無一切裡證下之則癰氣逆陷故禁尾不可下也又言溫煖蓋覆不令通風以癰未出或身表涼而惡寒或天令寒而惡冷溫煖蓋覆不令通風也癰若已出身熱天暄何必用蓋覆而

不使之通風乎後人執此二句首尾俱不敢下溫煥不
令通風不知天令之所加人身之所盛致使悞人多矣
大抵前人之言隨時應變後之人不知其變故常執而
不移也噫首尾俱不可下者以其始終臟腑元無凝滯
也若有一切裏證及大便結者安得不下溫煥不使之
通風以其發在冬時故如此也若發在夏時癰雖未出
亦不用此也癰之用藥大率以脈為主浮中沉之診平
舉按之候察其虛實定其中外則可以萬全矣 萬全

之治痘者曰首尾不可汗下聽者和之曰痘宜溫補汗下不可也此亦喜補惡攻之遺弊殊不知治痘之法莫要於解毒或攻或補務使毒氣得解而已如其氣血和暢榮衛流通表裡無邪其出則盡其發則透其收則時非但不可汗下雖溫補亦不可用也設使外感風寒約束皮膚閉密腠理瘡出不快此當汗之令陰陽和榮衛通而瘡易出毒得解散可也苟不汗之則毒無從得出留伏於內未免留寇之禍矣如大熱不退煩渴轉增譫

妄昏沉便溺閉塞此毒畜於腸胃之間與穀氣併宜急下之使臟腑疎通陳莖滌去可也苟不下之則藏汚畜毒煎熬於中寧無養虎遺患之悔乎故大要曰謹守病機各司其屬有者求之無者求之盛者責之虛者責之必先五勝疎其血氣令其條達而致和平此之謂也

證治大法

錢氏法瘡疹惟用溫平藥治之不可妄下及妄攻發受

風冷

海藏云溫平者非熱劑如荊芥薄荷防風牛蒡子甘草之類活人鼠粘子湯與潔古解毒防風湯相

煎選用是也丹溪云鼠粘子連翹山查甘草此四味痘疹始終必用之藥

診睦親宮中十

王瘡疹云瘡疹始終未有他證不可下但當用平和

藥頻與乳食不受風冷可也如瘡疹三日不出或出不

快即微發之

鼠粘子湯之類

如瘡發後不多出即加藥

如一日一貼即

加至二貼

加藥不出即大發之

升麻葛根防風羌活獨活麻黃桂枝之類

如發後

不多及脈平無證即瘡本稀不可更發也有大熱者當

利小便小熱者當解毒

利小便四聖散之類

若不快勿發勿下攻

止用抱龍丸治之瘡疹若起能食者大黃丸下一二行

即止有大熱者當利小便有小熱者宜解毒若黑紫乾陷者百祥丸下之不黑者慎勿下身熱煩燥腹滿而喘大小便澀面赤悶亂大吐此當利小便不瀉者宣風散下之也若五七日痂不焦是內發熱氣蒸於皮中故瘡不得焦痂也宜宣風散下之用生犀角磨汁解之使熱不生必著痂矣

東垣師弟法潔論曰癰疹之病其為證各異瘡發焮腫於外屬少陽三焦相火也謂之癰小紅靨行皮膚中不

出者屬少陰君火也。謂之疹。凡顯癰疹。若自吐瀉者。不可妄治。而多吉。謂邪氣上下皆出也。大凡癰疹。首尾皆不可下。云詳前汗下條

安裏解毒防風湯

防風

一兩

地骨皮

黃耆

芍藥

荊芥

枳殼

鼠粘子

各等分

右為末。水煎。四五錢服。若能食而大便實。宜當歸丸微利之。

當歸丸

棗變百祥丸

並大便秘

垣消毒救苦湯

治癰證悉具消化便令不出若已出

稀者再不生癰十一月立此方四時加減惟通造化

明藥性者能之

麻黃根

羌活

防風

升麻

黃蘗

酒炒各五分

柴胡 川芎

細辛

藁本

葛根

黃芩

酒炒

蒼朮

各二分

黃連

歸身

各三分

蘇木

甘草

生

白朮

橘皮

各二分

吳茱萸

半分

紅花

少許

連翹

半錢初出者減出大者加

生地黃

五分

右吹咀每服五錢水二大盞煎至一盞去查稍熱服
痲疹者因內傷必出痲乃榮氣逆故也大禁牽牛巴
豆峻藥宜半夏枳實大黃益智仁之類去瀉止吐若
耳尖冷呵欠睡驚嚏噴眼澀知必出痲也宜

升麻

葛根

白芍藥

甘草

歸身

連翹

右各等分吹咀水煎服此定法也後隨證加減

如肺出膿痲先顯喘嗽或氣高而喘促少加人參黃

芩以瀉伏火而補元氣 如心出小紅斑必先見噬
乾驚悸身熱肌肉腫脈弦洪少加黃連 如命門出
癰疹必先骨痛身熱其疼痛不敢動搖少加生地黃
槩 諸斑疹皆為陰證瘡皆因內傷乳食脾胃不足
榮氣逆行雖火勢內熾陰覆其外故錢氏製四物升
麻湯發之如有傳變證依加減法服之

世如疹痘則發於脾宜陳氏人參清膈散

疹者皮膚隱
隱如麻名曰

麻子

水疱者多因傷寒熱毒而發宜升麻散及羌活散

丹溪分氣血虛實丹小兒痘疹分氣血虛實以四君四
物酒炒苓連等服之 氣虛參朮加解毒藥 血虛四
物加解毒藥 婁加解毒藥者酒炒苓連是也 海藏
云解毒者三黃湯金花丸之類

痘疹分人之清濁就形氣上取勇怯 痘瘡紫屬血熱
涼血為主白屬氣虛補氣為主中黑陷而外白色起遲
者則補氣中略帶涼血藥

萬痘瘡主治解表和中解毒三法也解表兼發散之義

使邪氣盡出於外不使留伏於中如防風白芷荆芥穗
升麻葛根柴胡桂枝之屬和中專主脾胃兼助血氣使
裏氣常實血氣不虧助養痘瘡而待其成不致癢塌倒
陷如黃耆人參白芍藥當歸木香陳皮之屬解毒只瀉
火涼血清氣使毒邪有制不為正害如山豆根大力子
紫草連翹芩連梔子之屬

翁仲仁分氣虛血熱熱壅三證

辨法詳
虛實條

凡氣虛之證

初發身熱手足厥冷乍涼乍熱精神倦怠肌肉晄白飲

食減少四肢倦而睡卧安静便清自調虛證無疑未見
點前用參耆飲加輕劑發散如紫蘇防風白芷見點之
後用參芪飲加輕劑如川芎桔梗見點四日之後重用
參耆飲隨病加減處治七日八日漿足之後保嬰百補
湯調養氣血而已此證末稍塌陷黑靨者多用木香異
攻散收功 凡血熱之證初發身熱壯盛腮紅臉赤毛
焦色枯煩躁渴欲飲水日夜啼哭睡卧不寧好睡冷處
小便赤澀熱證無疑未出之前升麻葛根湯或升麻流

氣飲雖皆可服總不若十神解毒湯為穩未出至見點
三四日後熱證悉平勢將行漿從太乙保和湯加減八
九日漿足之後則有保嬰百補湯調養之此證七八日
間有紫黑乾枯及青灰乾黑陷者則有奪命大造談笑
博金一字金或百祥牛李豬尾獨神等方皆可審用惟
經泄瀉之後有黑陷乾紅者則從木香異攻散治之此
祖宗世業不傳之秘萬試萬中者也 凡熱毒壅遏之
證初發身熱壯盛腮紅臉赤毛焦皮燥氣粗喘滿腹脹

煩躁狂言謔語睡卧不寧大便秘結小便赤澀面浮眼
脹多啼多怒的係熱毒壅遏未見點時先須升麻葛根
湯一服隨服羌活散鬱湯至見點三日之內諸證悉平
勢將行漿則服益元透肌散加減漿足之後服嬰童百
補湯調養而已六七日外有紫黑乾枯及青灰乾白陷
者則有奪命大造談笑博金一字金百祥牛李猪尾獨
神等方皆可審用惟曾經泄瀉有木香異攻證則從木
香異攻散治之 治虛弱痘證有二法的係氣虛則宜

補氣氣虛易寒又宜溫之溫補一法之中酌量輕重處
治方為妙用 治血熱壅遏有五法表熱盛則痘必乾
枯表太涼則冰伏內熱盛則秘結太涼則泄瀉氣壅盛
則腹脹喘滿熱毒為所抑而不得伸越則腹脹狂亂毒
氣彌盛則表裡受重而嬰童難任是故治痘之法在安
表和中勻氣透肌解毒五者而已安其表使無乾枯冰
伏之患和其中使無便秘泄瀉之變勻其氣使無壅盛
喘滿之過透其肌使熱毒得以伸越而達表解其毒使

內外有所分消五者不失則血熱壅遏之證勢雖綿密亦不足憂矣

參耆飲

即保元湯

專治元氣虛弱精神倦怠肌肉柔慢面

青眊白飲食少進睡卧寧靜而不振者不分已出未出皆治

人參

錢一黃芪

錢一甘草

五分初熟生用出定灸用

楊仁齋謂其能補益元氣更名保元湯蓋為元氣虛弱者立也後世治痘者多主之不分元氣虛實之異

漿用於血熱毒壅之證是為以實攻實豈不悞哉

右用水一鍾薑一片煎四五分不拘時服

參考飲加減禁忌法

如前虛證辨認不差以此方為主前後始終皆不可
易中間雜證兼見雖或不同要皆氣虛所至則以本
方而斟酌加減之母得過投發散苦寒之劑初熱未
出之際只可少濟以開提勻氣之功如桔梗川芎之
類漿足之後助以收斂如白朮芍藥茯苓烏爾

出不快加川芎官桂禁用蟬退鼠粘子人牙紫草

小便赤加大腹皮茯苓禁用滑石車前瞿麥山梔

大便澇加白朮茯苓肉果禁用猪苓訶子龍骨礬石

小便短澀加大腹皮木通禁用滑石瞿麥 大便

實秘加酒炒當歸禁用大黃枳殼生地 泄瀉加白

朮肉果木香禁用龍骨石脂枯礬 嘔吐加乾薑丁

香橘皮禁用半夏 煩渴加麥門冬芍藥五味子禁

用天花粉葛根烏梅半夏 減食加白朮人參神麴

禁用山查砂仁 傷食加神麴麥芽山查禁用枳實
蓬朮三稜巴豆大黃 喘急在三四日前者加桔梗
蟬退杏仁 風則微散之加紫蘇防風枳實 痰則
從痰治加杏仁貝母 有虛證見者決非實喘不過
是毒不得外達上乘於肺耳禁用麻黃萊菔蘇子枳
殼下氣等藥 六七日後或先曾泄瀉而後氣喘者
虛之極也加人參則喘自止 腹脹加大腹皮厚朴
兼發散開提禁用枳殼萊菔寬中下氣等藥仍視小

便秘與傷食否亦有傷於生冷或寒氣鬱遏而然從
內傷外感而治 內傷用丁香官桂神麴木香 外
感用防風等藥發散治之 當熱不熱四五日間手
足厥冷冰硬不起加丁香官桂灸黃芪川芎夏月減
丁香四肢不起加防風減川芎 漿不足加白朮當
歸川芎 灌水泡加白朮防風白芷芍藥 灌清漿
加白朮茯苓 喘嗽加五味子杏仁麥門冬禁用天
花粉桑白皮 發癢加川芎當歸芍藥白朮茯苓禁

用殭蚕蔕藜甚外用茵陳燒烟熏之禁用沐浴發散之藥恐成氣脫

十神解毒湯 專治身發壯熱腮紅臉赤毛焦色枯已出未出三日已前痘點煩紅燥渴欲飲睡卧不寧小便赤澀者此熱盛也並皆治之

當歸尾 生地黄 紅花 牡丹皮 赤芍藥

桔梗 木通 大腹皮 連翹 川芎

此方治血熱痘疹以涼血行血為主佐以桔梗川芎

有開提發散之功引以大腹皮木通有疎利熱毒之效臣以連翹牡丹皮有解毒之良用此以治血熱痘疹則能內外分消熱毒雖盛庶幾解散表裡自然和平矣古人用黃連解毒湯恐驟用寒涼不惟冰伏熱毒恐出不快抑且熱毒為其所抑則鬱於臟腑或肚痛腹脹內潰而死者有之豈若此方之為穩當若不得已而用黃連芩檉亦須酒炒一以製其寒涼之性一以助其上行之勢借連檉以解毒耳

十神解毒湯加減法

身熱壯盛加葛根前胡 毒熱綿密加荊芥鼠粘子
渴加天花粉竹葉滑石 小便尿血加犀角山梔
大便黑加犀角黃連或桃仁 吐血乾嘔加黃連犀
角 發紅斑加犀角黃芩黃檗山梔玄參 小便赤
加山梔 小便短澀加豬苓澤瀉 小便秘加滑石
瞿麥 大便秘加枳殼前胡 大便秘喘加枳殼前
胡大黃 煩躁加麥門冬天花粉煩渴狂亂譫語加

知母麥門冬石膏 嘔吐加猪苓澤瀉黃連 咽喉

痛加甘草鼠粘子荆芥 泄瀉加豬苓澤瀉防風

嘔加橘皮 已上竝用燈心十四根水煎服血熱

痘證熱毒彌盛然毒氣無所分消只宜重用升提發
散使毒得以達表而從外解引以滲泄使熱得以潤
下而從內消佐以清涼消毒行血涼血之劑則痘雖
稠密亦能消散自易漿而易化也所謂輕其表而涼
其內此方蓋得安表和中解毒三法盡善誠痘科之

神方也丹溪曰熱者清之實者平之其此方之謂歟
是故發熱至見點之後三日以前毒氣未盡達表內
外彌盛血熱之證悉具辨認不差並只以本方處治
之切不可下參芪白朮茯苓補氣之藥於熱證未漿
之前如悞而用之是謂以實攻實腹脹氣喘狂亂譫
語咽喉腫痛口舌生瘡變證百出所謂邪得補而愈
盛也嘔吐泄瀉慎不得用半夏丁香桂乾薑木香藿香
訶子肉果如悞而用之則是以熱助熱氣得熱而愈

亢也燥證必至咽疼狂亂失血便秘無所不至矣至
於龍骨枯礬澀滯之物且能使氣道阻塞是欲其出
而閉之門也腹脹之患生而喘急之勢至矣尤宜戒
之及至血疱已成氣血定位頭頂白光勢將行漿又
宜易方另行別議

羌活散鬱湯 專治實熱壅盛鬱遏不得達表氣粗喘
滿腹脹煩躁狂言譫語睡卧不寧大小便秘毛豎面
浮眼張若怒並有神效并為風寒外搏出不快者同

治

防風 羌活 白芷 荆芥 桔梗 地骨皮

川芎 連翹 甘草 大腹皮 鼠粘子 紫草

右為粗散水一鍾燈心十四根煎六分溫服

身初發熱及見點之際毒氣壯盛外為風寒所抑或
肌肉粗厚腠理堅閉肌竅不通經絡阻塞使清氣不
得引毒達表循竅而出則熱毒壅遏於內為腹脹為
喘急為秘結為狂煩為驚搐為失血皮燥毛直面赤

眼脹睡卧不寧驚啼多哭此熱毒壅遏之證辨認不
差急宜用發散開提之劑佐以和解透肌之法則熱
毒不壅而其出自易矣羌活白芷防風有升提發散
解毒之長桔梗有開提勻氣之能荊芥黃連鼠粘善
解鬱熱地骨皮消壅熱於筋骨之間且能肅清臟腑
紫草滑肌通竅大腹皮引熱下行使內外有所分消
用此以治熱壅之證効大而功用極妙若驟用寒涼
如芩連升麻之類則熱為寒氣所抑不得伸越逗遛

經絡為疽為癰者有之冰伏硬閉有之至於人參黃
芪白朮茯苓溫補之劑誤用則壅盛禍不旋踵他如
丁香桂木香羌附之類以熱攻熱殺人立至尤宜慎戒
故發熱之初至見點之後並宜以本方處治依後法
而加減之

羌活散鬱湯加減法

初發身熱壯盛腮紅面赤毛焦皮燥咳喘急者加升
麻 煩渴加天花粉乾葛 腹脹喘急鼻塞面赤若

怒毛直及枯加麻黃 便秘加當歸枳殼甚則加大
黃 嘔吐加猪苓澤瀉橘皮禁用生薑丁香木香半
夏 洞泄加升麻禁用白朮茯苓豈菟龍骨等劑
喘嗽惡風加桑皮紫蘇 失血加犀角地黃黃連
發斑加黃連黃芩山梔 小便赤澀加滑石山梔地
黃芍藥 鼻衄加黃芩犀角 驚悸加木通山梔
槁加青皮 不思飲食加山查 傷食加山查神麴
麥芽 見點二三日間出不快利加鼠粘子山查蟬

退名透肌散 煩紅赤色加生地黄紅花牡丹皮去
白芷防風 皮急肉緊身熱壯甚加葛根前胡

見點三日之內並依本方加減及三日之後痘瘡出
齊血疱已成而前證悉平不得復用此方恐發散太
過難於行漿另有方藥在後其禁用藥劑並從血熱
痘證法而裁治之故此方不立禁忌辨

太乙保和湯

又名紫草透肌湯

專治血熱痘證服十神解毒

湯後熱證悉去內外和平見點三日之後不易長大

粗肌者用之則能保和元氣活血解毒助痘成漿易
痂易落也

桔梗 紫草 川芎 山查 木通 人參

紅花 生地黃 甘草

糯米 五十粒

右用燈心七根薑一片水一鍾煎六分溫服

便澀腹脹加腹皮 繁紅不潤加當歸蟬退 出不

快加鼠粘子 陷塌加黃耆 痛加白芷 不勻加

防風 水疱加白朮芍藥 嗽加五味子麥門冬

渴加麥門冬 瘡加白朮芍藥 七八日後漿足身
復壯熱便秘煩渴腹脹喘急前胡枳殼湯漿足禁用
此方另立湯飲在後

益元透肌散 專治壅熱痘證服羗活散鬱湯後壅證
悉開氣血和平見點三四日後不肥大者不成漿者
用之則能勻氣解毒透肌達表領出元陽助痘成漿
而易結膿窠也加減與保和湯同論漿足之後另有
保嬰百補湯在後

即太乙保和湯去生地紅花加蟬退鼠粘子陳皮
右水一鍾加燈心十四根棗二枚煎六分溫服

保嬰百補湯 專治痘瘡八九日漿足之後別無他證
並以此方調理氣血資養脾胃不拘實熱二痘皆可
服之惟氣虛證八九日後本方加黃芪二錢官桂少
許若有別證在審虛實隨證加減而已

當歸 芍藥 地黃 白朮 人參 茯苓

山藥 甘草

右水一鍾棗二枚煎六分溫服

陳氏惟主溫補陳痘瘡未出已出之間或瀉渴或腹脹
或氣促謂之裏虛速與十一味木香散治之如已出之
間其瘡不光澤不起發根窠不紅謂之表虛速與十二
味異功散治之如已出之間其瘡不光澤不起發根
窠不紅或瀉渴或腹脹或氣促是表裏俱虛也速與十
二味異功散送下七味肉苳蔻丸治之

丹溪云木香異功散二藥治寒

的當若虛而不寒者禍不旋踵

如瘡始出一日至十日渾身壯熱大

便黃是表裡俱實也其瘡必光澤必起發必飽滿必易
靨而不致損傷若無他疾不宜服藥 表裡俱實者易
出易靨表裡俱虛者易出難靨表虛難出裡虛難靨隨
證治之 張吳之治痘要法吐瀉少食為裡虛陷伏倒
靨灰白為表虛二者俱見為表裡俱虛全用異功散救
之甚至薑附靈砂亦可用若止裡虛減官桂若止表虛
減芫蕘不減官桂丁香若能食便秘而陷伏倒靨者為
裡實當用錢氏及丹溪下法若不吐瀉能食為裡實裡

實而補則結癰毒紅活綻凸為表實表實而用表藥則潰爛不結痂凡痘但見疵點便忌葛根湯恐發得表裏俱虛也

丹讀前人之書當知其立言之意苟讀其書而不知其意求適於用不可得也痘瘡之論錢氏為詳歷舉源流經絡分明表裏虛實開陳施治之法而又證以論辨之言深得著書垂教之體學者讀而用之如求方圓於規矩較平直於準繩引而伸之觸類而長之可為無窮之

應用也今人不知致病之因不求立方之意倉卒之際
據證檢方謾爾一試設有不應竝其書而廢之不思之
甚也近因局方之教久行素問之學不講抱疾談醫者
類皆喜溫而惡寒喜補而惡解和忽得陳氏方論皆用
燥熱補劑其辭確其文簡歡然用之翕然信之遂以為
錢氏不及陳氏遠矣或曰予以陳氏方為不足歟曰陳
氏方誠一偏之論雖然亦可謂善求病情者其意大率
歸重於太陰一經蓋以手太陰屬肺主皮毛足太陰屬

脾主肌肉肺金惡寒而易於感脾上惡濕而無物不受
觀其用丁香官桂所以治肺之寒也用附木半夏所以
治脾之濕也使脾與肺果有寒與濕而兼有虛也量而
與之中病則已何傷之有今也不然但見出遲者身熱
者泄瀉者驚悸者氣急者渴思飲者不問寒熱虛實率
投木香散異功散間有偶中隨手獲效設或誤投禍不旋
踵何者古人用藥製方有向導有監制有反佐有因用
若錢氏方固未嘗廢細辛丁香白朮參芪率有監制輔

佐之藥不專務於溫補耳然其用寒涼者多而於補助一法略示端緒未曾深及癡人之前不可說夢錢氏之慮至矣亦將以候達者擴充推廣用之耳雖然渴者用溫藥癢塌者用補藥自陳氏發之迥出前輩然其多用桂附丁香辛芳燥熱恐未為適中也何者桂附丁香輩當有寒而虛者固是的當虛而未必寒者其為患當何如耶陳氏立方之時必有挾寒而用一偏之方寧不過於熱乎余嘗會諸家之粹求其意而用之實未敢據其

成方至正甲申陽氣早動正月間邑間痘瘡不越一家
率投陳氏方幼童死者百餘人雖由天數吾恐人事亦
或未之盡也

王汝言曰若痘瘡虛怯淡白色癢塌此屬虛寒宜用陳
文中方若發熱壯盛齊湧紅紫色燥癢此屬熱毒急宜
涼血解毒自陳文中方盛行後屬虛寒者率得生屬熱
毒者悉不救痘是胎毒古人治法只解毒然氣血虛則
送毒氣不出及不能成就故陳文中之法亦千載妙訣

補前人之未備者但溫補之法既行而解毒之旨遂隱
故救得一邊又害了一邊

凡治痘子要識證候如痘脚稀疏根窠紅潤不瀉不渴
乳食不減四肢溫和身無大熱如此候者不須服藥惟
善調護以待成就而已若癢塌寒戰咬牙渴不止痘紫
黑色喘渴不寧灰白色頂陷腹脹頭溫足冷悶亂飲水
氣促泄瀉渴如此候者不必服藥雖強治之亦無功也
凡治痘瘡善攻不如善守表裡無邪不須妄治有等貪

利之人不分虛實妄投湯丸謂曾治某病治某病貪天功以為己有以致虛虛實實致主變異悞人性命此醫之罪也

用藥萬凡痘子用藥須分氣血虛實毒氣微盛而治故灰白者不起發者癢塌者吐利者寒戰咬牙者手足冷者皆氣虛也宜用補氣之劑瘡乾者不紅活者膿水少者皆血虛也宜用補血之劑稠密者焮腫者紅紫者皆毒甚也宜用解毒之劑陷伏者兼氣血解毒治之凡

用補氣宜四君子湯如瘡帶濕或有自利用之可也若瘡乾者白木燥津液茯苓滲津液或便秘實者不可用也凡用補血宜四物湯如瘡乾或色大嬌用之可也若不能食者生地黄泥膈白芍藥收斂脾胃不可用也凡解毒不過黃連黃芩黃檗梔子連翹牛蒡子升麻之屬俱用酒製恐寒涼反損脾胃也若欲行表須少加桂枝他如紫草山豆根葛根之類則不必用酒製矣凡用解毒藥要別臟腑分陰陽而治之如黃連解心火

黃芩解肺火梔子解肝火黃檗解腎與三焦火石膏解脾胃火木通解小腸火黃芩又解大腸火連翹牛蒡子解瘡毒火山豆根紫草解痘毒火升麻解疫毒火各有主治不同也又歲半已上屬陽心肺主事宜芩連多用之歲半已下屬陰腎肝主事宜黃檗梔子多用之秘傳八味二花散

桃花蕊

五錢梅花蕊

二味不拘多少陰乾共一兩六錢二分

穿山甲

取四

足者酒炒一兩

朱砂

水飛過一兩

紫河車

水洗去紅筋焙乾為末一具

天靈

蓋

一具以皂角煎湯洗淨酥製為末四分共一錢七分

鹿茸

去毛酥製三分共一兩二錢

人參

官揀者一兩

右各為末痘疹未出之先以硃砂一兩為君梅花二錢桃花三錢共一處和勻每服五分或三分或二分半用雄雞與酒二杯灌之與食倒懸刺血入杯中以熱酒調前藥同服 初熱不起以桃花一兩為君加桃花一錢天靈蓋五分 氣血虛灰白色用紫河車一兩為君加天靈蓋一錢鹿茸一錢五分梅花一錢桃

花一錢或八分 黑陷不起以穿山甲一兩為君加
桃花一錢梅花八分天靈蓋七分麝香五分 氣血
虛不能灌漿以鹿茸一兩為君加紫河車二錢桃花
一錢梅花八分天靈蓋七分麝香五分人參一錢
氣血虛不能收靨以鹿茸一兩為君加天靈蓋五分
桃花七分梅花九分 落靨之後癰色白氣血虛以
人參一兩為君加紫河車二錢鹿茸一錢梅花一錢
五分 以上咸做首條服法

保生散

紫河車

製如前

龜板

酥炙一分

鹿茸

酥炙各一兩

右為末量兒大小用血虛川歸茯苓紫草湯下氣虛人參黃耆甘草湯下

初熱證治

海小兒癍疹初發未能辨認間但求所出之由因內因外及不因外內隨其所傷如法服餌防其變故抑其盛氣比之他證尤不可緩或發或瀉或解其肌或化其毒

求其所起之由涼血清肺調其臟腑平其飲食謹其禁忌嚴其養攝適其寒溫將理有法俾盡其道使出無不快之經成無不痼之潰既愈之後不致遊毒流汗虛腠目疾膜翳瘡癰癰瘤喉閉噤腫潮熱汗泄此治癰之大略也

海藏所謂癰即瘡也非心為癰之瘡

又云外者外治內者內治內

外皆和其瘰自出至於惡寒者發之表大熱者奪之渴者清之大便秘結者下之小便不通者利之驚者安之泄者分之可以執一為哉大抵傷寒同治隨經用藥最

為高論假令五日已裡諸病與癰疹不能辨別者不可
疑作癰疹必須發之但各從其所傷應見治之皆不妨
癰出若強發之其變不可勝數矣如外傷升麻湯主
之 內傷枳實丸主之 大便溼者枳朮丸主之 若
傷冷者溫之神應丸 惡寒者發之宜防風蒼朮湯
表大熱者奪之此表者通言三陽也夫陽盛者氣必上
行言奪者治之不令上行也是知無三陽表證有三陽
裡證染於有形也此言表總三陽之名也 渴者清之

大渴者白虎湯

暑月用之

小渴者涼膈散

涼膈散去硝黃加甘桔者穩

大便秘結者下之桃仁承氣湯四順飲子柴胡飲子

選用察其在氣在血必內實能食而秘者可用但當微微潤之小便不通者利之導赤散八正散之類當求上下二焦何經而用之驚者安之涼驚丸重者瀉之瀉

清丸泄者分之寒則異功散四君子湯熱則澤瀉茯苓湯

苓湯呂凡瘡欲出而未出因發搐者是外感風寒之

邪而內發心熱也宜王氏惺惺散或人參葛根湯木香

參蘇飲 凡瘡欲出未出而吐利者是中焦停寒或夾

宿食也宜四君子湯加砂仁陳皮或和中散如夾宿食者

用紫霜丸 張治痘全在發熱之初看其熱勢微甚微

者固不必治甚者當解則解當汗則汗當下則下使毒

氣得以發洩則後去不能為害痘亦稀少平順失此不

治則熱毒漸盛難以解救大抵此際熱甚非汗則表不

解非下則裡不解然藥味之輕重當隨病勢之微甚而

用之 垣痘證少具痘未發與升麻湯三五錢帶熱服

之待其身表溫和痘證已顯止藥如其身涼痘證未出
只時時與甘桔湯寬胸膈利咽喉 大便酸臭不消化
畏食或吐乃內傷飲食宜枳朮丸傷冷食飲神應丸
如見傷食又見痘證先與不犯大黃巴豆藥尅化過再
與升麻湯如食重傷前藥不能過再與犯大黃巴豆藥
過之此須分證之表裡虛實而斟酌之先裡後表亦非
古法如尅化藥不能過多是脾氣虛而尅化藥又重傷
之若無便秘裡實之證其可遽用大黃巴豆下之乎

凡初發疑似但肌表熱而無內傷證者宜用辛涼之劑調之以四物解肌湯主之 或云凡發熱疑似之間宜用人參敗毒散一劑以發之是與不是一發便明大抵瘡痘只要發盡不使留伏於中也 凡發表宜保嬰丹加薑蔥煎湯化下一也或升麻葛根去升麻加蘇葉薑蔥二也或羌活散加製砂薑蔥三也此可行之於已發熱之時未發熱之前不可行也既見紅點之後亦不可行恐表虛故也如或行之只宜參蘇飲調保嬰丹厚蓋取

汗 凡初發表要看天時如時大寒則腠理閉密氣血凝澀防其發泄得遲有毒氣壅遏之變以辛熱之藥發之宜桂枝葛根湯五積散去乾薑主之如時大熱則腠理開張氣血淖澤防其發洩太急有潰爛之變以辛涼之藥解之宜升麻葛根湯雙解散主之如不寒不熱天氣溫和只人參敗毒散甚佳 翁小兒出痘凡裡有大熱當利小便使心火有所引導雖不用涼藥其毒自去矣導赤散主之若裡有小熱不宜利小便當解毒若小

熱利小便反泄腎氣宜犀角地黄湯消毒飲 萬或曰痘
瘡發熱何以能預識其輕重而解之耶曰凡發熱乍進
乍退氣色明瑩精神如常大小便調能食不渴目清唇
潤此毒輕也痘必稀疏縱出多亦自易發易靨如壯熱
不減氣色慘暗精神昏悶大便秘或瀉不能食目赤
唇焦此毒甚也痘必稠密宜預解之其出疎者防其有
伏未可便許為疎但看熱減渴止精神爽快清便自調
能食更無他若是真疎且輕也 或曰既識其候知痘

稠密何以解之曰諸瘡皆屬於心心之華在面如初發熱青筋現露目中淚出此毒發於肝肝木生心火從後來者為實邪肝為水泡風火相扇必作瘰癧宜先解肝之毒面赤如錦額上紅筋露現譫妄多驚此毒發于心心火自旺為正邪君主不明必有陷伏不治口乾唇焦面黃而燥此毒發于脾心火生脾土從前來者為虛邪脾為癰心為疹必有夾癰夾疹又脾主肌肉為火所灼必作潰爛宜先解心脾之毒面色晄白鼻中乾燥或流

清涕或衄出此毒發於肺心火刑肺金乘其所勝為微邪宜略解肺之毒面色黑氣如烟浮目中見鬼頭熱足冷此毒發於腎腎水尅心火為賊邪必成黑陷不治瘡疹發熱熱氣微者其毒必少痘出自疎易發易靨不須服藥熱氣甚者其毒必多痘出自密難發難靨且多他變宜預解之宜連翹升麻湯或如聖湯並合代天宣化丸主之或有微熱痘出反密者其人必口燥渴唇焦烈小便赤少大便秘身雖不大熱却蒸蒸然此毒深熱

亦深故表不大熱而裡熱也宜急解之 若煩渴引飲
大熱如炙頭痛如破或自汗或無汗宜白虎湯主之甚
者石膏用至半觔溽暑之時有此證尤宜用之 或有
熱甚痘出反疎者其人必不渴唇潤目中無赤脈大小
便調身雖大熱但熛熛然此毒淺熱亦淺故表熱裡氣
和也只以升麻葛根湯主之乍涼乍熱瘡疹常候若遍
身如火晝夜不休此心火亢甚肺金益燥為失其常宜
消詳表裡證候以施治也如口燥渴目赤唇焦大小便

不利此表裏俱熱也雙解散或連翹升麻湯或黃連解

毒湯

煩燥

送下七物升麻丸

四方俱本條

如咽喉痛甘桔湯

加牛蒡子或射干鼠粘子湯

俱咽喉

加桔梗使咽喉爽快

胸膈開豁失今不治他日咽喉閉塞水入則噎穀入則

嘔暴啞失音悔之無及如初發熱時時惡寒身振振搖

動如瘧之狀其人衛氣素虛榮血亦弱不能逼毒快出

使毒邪留連於經絡之中欲出不出與正相爭故振振

者火之象也以紫葛桂枝湯加黃芪主之瘡出即愈不

可錯認作寒戰妄投陳氏辛熱之劑以誤人也

古人養生或治病者常順四時之氣謂之勿伐天和如春夏養陽秋冬養陰飲食起居各有攸宜凡瘡疹發熱之時其初發表解肌四時各有主方春用羌活湯

痘發熱

夏用五苓散

驚

秋用參蘇飲冬用五積散四時通用人

參敗毒散又如春肝旺風木主事調養之法宜四物湯

失血

加防風黃芩木香青皮羌活以折風木之勝又以

四君子湯

不能食

加白芍藥桂心以補脾之受制相間服

之夏心旺熱火主事宜黃連解毒湯

煩燥

加麥門冬五

味子以補肺之不足秋肺旺燥金主事宜瀉白散

肺合

甘桔湯

咽喉

加牛蒡子馬兜鈴以散肺中之邪又以四

物湯去川芎加天麥門冬天花粉以潤其燥冬腎旺寒

水主事宜五積散以散表之寒理中湯

泄利

加黃芪炙

木香丁香以勝裡之寒此四時之治法也如天有暴風

連日不止恐有風邪桂枝葛根湯夏月盛暑或非時之

熱人參白虎湯渴冬月嚴寒或非時之寒四君子湯加

桂枝生薑久雨濕盛五苓散加蒼朮此四候者必瘡變
色有異證可依其法治之苟無他候不可妄治也惟謹
帷幙遠風寒毋令大熱毋令大寒但常和煖更常服蟬
退膏蓋此膏能禦風邪辟惡氣透肌快癰疹也房室之
之中常燒辟穢香禁忌勿得間斷

凡初發熱二三日間有驚搐者以導赤散

心羌活湯

發瘧

熱辰砂散

條本

主之大便秘者三黃丸

發熱

微利之小便

溫少者導赤散渴甚者葛根解毒湯

痘渴

腹中痛者桂

枝大黃湯

痘腹
痛

腰痛者人參敗毒散

本條

自利者黃芩

湯

痘泄
利

吐利者黃芩加半夏湯

痘吐
利

如脾胃素弱自利

清白者理中湯丸

痘泄
利

或四君子湯

不能
食

肉豆蔻丸

痘
泄

利合而服之 餘詳各門

發表升麻湯

治大人小兒時氣瘟疫頭痛足冷脈數

發熱肢體煩燥疼及瘡疹疑貳之間並宜服之或未

經解利而瘡毒已發又云證候未全或未明者但可

與解散之也又云患瘡疹大便自如常者亦可服升

麻湯盖用升麻其性苦寒無毒主解百毒殺鬼邪辟
瘟瘴蠱毒中惡腹痛咽喉口瘡皆毒也瘡痘亦毒故
也其次用葛根性平治消渴大熱解肌發表出汗開
腠理治頭痛升麻葛根二藥皆治伏熱毒動心恍惚
驚悸煩燥大抵瘡疹是蘊熱毒葛根解熱升麻去毒
也病熱而藥性微寒冷熱相攻則芍藥治時行寒熱
又活血痺使瘡痘易出也又利小便瘡疹有大熱者
則利小便也次有甘草調和之况新書言瘡疹渴燥

甚者亦用灸草散主之四者解毒治熱調榮衛為治
瘡疹之要藥也為其疑貳之間非瘡疹伏熱而發者
有傷寒傷風傷食驚證兼患瘡疹而稟氣怯者皆發
虛熱而非實熱若服之是瘡疹者則毒減而愈他證
者反以為害不能盡述其由但有壯熱而面青目白
睛不黃赤大便不秘小便清者皆不可服裡無蘊熱
故也此藥治未發瘡痘之前瘡疹已愈之後服之消
毒故也非正出時服

升麻 葛根 芍藥 甘草

等分

右為粗末每服二錢水一盞同煎至半盞去渣溫服不拘時候亦可為細末湯調服身心煩熱即溫服寒多即熱服

海藏云升麻葛根湯太陽陽明之藥 陳文中云身

熱腹痛者身熱泄瀉者身熱驚悸者身熱汗出者身

熱足冷者俱不宜服升麻葛根湯 張巽之云凡痘見

癍點忌葛根湯恐發得表虛也 萬氏曰古人謂但

見紅點便不可服升麻葛根湯恐發得表虛也此蓋
為痘疎毒少者言後人不達立言之旨遽謂凡出痘
子纔見紅點真不可服殊不知升麻葛根湯四味乃
發表解毒疎通血氣升降陰陽之劑痘出太密正宜
常服以解之令陷者升之燥者潤之鬱者疎之過者
平之陰精不衰而陽毒不亢也苟謂痘疎毒少者雖
他藥不可服況葛根湯乎

古人治痘以葛根湯為主後世好奇多立方法法愈

多而治愈難矣苟能變通自發熱以至收靨葛根湯皆可增損用之不特發表解肌而已今以葛根湯為主治隨證立增損法於後

初發熱解表加柴胡羌活白芷桔梗防風口乾渴內熱也加葛粉天花粉麥門冬 自利加條實黃芩生用 嘔吐加半夏生薑 腹中痛加木香青皮枳殼 山查肉 腰痛加獨活北細辛 頭疼加羌活藁本 蔓荊子 驚搐加木通生地黃燈心 小便少加木

通車前子瞿麥 大便秘加大黃 衄血加山梔仁
玄參生地黃 發熱三四日熱不減加解毒藥大力
子連翹紫草桔梗 瘡不出加防風蟬蛻荊芥穗紅
花子 眼痛加密蒙花柴胡龍膽草 瘡出太稠密
加人參當歸木香紫草大力子防風桔梗 咽痛加
桔梗連翹瘡乾或帶紫或色大赤者血熱也加當歸
稍生地黃紅花地骨皮牡丹皮 瘡灰白色平陷者
氣虛也加人參黃芪防風木香官桂 手足瘡不起

脾胃不足也加防風官桂人參黃芪 瘡密起發不
透又渴者此津液不足加人參麥門冬天花粉 泄
瀉者裡虛也加人參白朮訶子白茯苓 瘡不著痂

者濕熱也加黃芪防風官桂白朮

李氏加紫蘇五分
芦尖山查牛蒡子

各一錢冬月加
製過麻黃一錢

惺惺散 治數證皆為純陽人所用古人處為小兒藥

非乃裡寒者可服且以藥對其證用之意大抵渾身
壯熱必由風熱瘡疹傷寒時氣且先與之也其頭痛

目澀鼻流清涕者用細辛喘粗者用桔梗人參多睡者茯苓恐傷寒時氣乘裡弱者用白朮也治風熱瘡疹枯萎根枯萎味苦寒治身熱煩滿大熱除腸胃中痼熱八疸面黃燥渴通月水止小便利熱而胸痺不下乳陽證傷寒治癰下乳皆攻其熱也故非裡寒者可用其裡寒者由身有大壯熱不渴而大便反利小便不赤面青目白睛不黃赤皆裡寒證也其中雖有白朮以溫終非為虛熱者用人之臟腑寒則寒藥先

効熱藥未必能制之臟腑熱則熱藥先効寒未能制之此勢之自然也豈得不辨表裡冷熱而用藥也和劑方小兒傷寒壯熱當先服此大效次服羌活散如壯熱未退切不可與通利大便及涼藥恐是瘡疹服藥則誤矣

苦桔梗

細辛

去葉

人參

甘草

炒

白茯苓

去皮

栝蒌根

白朮

各一兩半

右為細末每服二錢水一鍾加薄荷二葉同煎至三

分去渣溫服要和氣加薑煎不拘時候身雖壯熱大
便自利者不可服 海藏云惺惺散治風熱咽不利
脾不和少陽渴小便不利也

荊芥散 治麻痘子兼瘙癢或癰疹大便自過

右用荊芥少許爛研以新井水將布帛裂過入一滴
許麻油打勻令飲之便不亂悶麻痘已出用黃蠟煎

青膠水飲即安

青膠水乃牛皮膠也

荊芥治血風麻子是疹子

常言風瘙癰疹則皆出皮膚其毒輕而浮又以麻油

打勻此滑竅之理又以黃蠟煎青膠水服則安此滋
血行榮衛榮衛既順麻疹出矣指用方荊芥湯乃消
毒飲加薄荷煎服之

羌活散 解熱散毒治風壅欲作瘡痘者

羌活 獨活 川芎 桔梗 蟬退 前胡

柴胡 甘草 枳殼 天麻 荊芥 防風

地骨皮

各等分

右為細末每服二錢水三分盞薄荷三葉盞內煎至

二分通口服量大小加減藥水此藥詳其藥味治風
治寒治驚下痰涼脾治血熱透肌但實熱發無所不治
如稟受怯弱或脾胃弱或外熱目白睛青色皆裡無
熱不可輕用

薄荷散 小兒纔覺是瘡疹宜服之

薄荷葉

一兩麻黃節

甘草

炙各半兩

右為細末每服二錢水一鍾棗二枚生薑三片同煎
至六分去渣放溫日三兩次服此是小兒稟受雍實

毒氣盛者宜服之。蓋此方云小兒纔覺是瘡疹便服之服之而汗出者服調中散服薄荷散若作寒熱脉反遲者進脫齒散以溫之詳其理非下藥之法也實者服之未必安虛者服之必危殆

參蘇飲

方見急驚

人參羌活散

方見急驚

羌活散

此方初熱暫用兼治驚搐

羌活

一錢二分

獨活

各八分

荆芥

各八分

前胡

各一錢

防風

柴胡

白芷

蟬退

甘草

各四分

細辛

一分

右加薄荷三葉水一鍾煎五分不拘時服發搐及熱盛不退者暫服煎熟用製砂調下治搐如神

人參敗毒散 治傷風瘟疫風濕頭目昏眩四肢痛增寒壯熱項強目睛疼尋常風眩拘倦風痰身體項疼及咳嗽鼻塞聲重寒熱並治之

柴胡 前胡 川芎 枳殼 羌活 獨活

茯苓 桔梗 人參

各一兩半 甘草

半兩

右為粗末每服三錢生薑薄荷煎

李氏敗毒散 治初熱壯盛等證

即前敗毒散加升麻荆芥牛蒡子蟬退山查地骨皮
薄荷紫蘇紫草減獨活柴胡茯苓人參如熱甚加柴
胡黃芩夏加香薷冬加麻黃瀉加猪苓澤瀉
右薑一片水煎臨服加葱白汁五茶匙

正氣散

甘草

炙三分

陳皮

藿香

去梗

白朮

各五分

厚朴

薑製

半夏

薑製各一錢半

右細切作一服加生薑三片大棗一枚水煎服
調解散

青皮 陳皮

枳殼

麩炒

桔梗

去蘆炒

人參

半夏

七炮

次

川芎

木通

乾葛

各四分

甘草

紫蘇

各二分

右細切作一服加生薑三片大棗一枚水煎服一方
加紫草糯米

蘇解散 治痘初壯熱頭疼腰痛腹疼作脹一切熱毒
甚者

紫蘇 葛根 防風 荆芥 白芷 蟬退

紫草 升麻 牛蒡子 木通 甘草 各等分

右加燈心葱白各七根水煎熱服

和解湯 解表和中

升麻 乾葛 各一錢半 白芍 一錢 人參 防風 各七分

川芎 八分 甘草 五分

右用薑一片水煎服 右十七方發表平劑

王朝奉四物解肌湯

芍藥 黃芩 升麻 葛根

右每服四錢水一盞煎至七分去渣服或云小兒傷寒疫癘潮熱瘡疹五日已衰疑似不能辨別者並皆辛涼之劑調之即以四物湯解肌之類 海藏云此論即有表也若內傷腹中有物未得大便而發熱者當以食藥去其物則可若得便後仍發熱在表者亦宜此解肌湯比錢氏升麻葛根湯減甘草加黃芩以有表熱之意也

防風蒼朮湯 治小兒邪熱在表惡風惡寒瘡疹未出

可解表發痘疹

防風

甘草

炙各半兩

蒼朮

石膏

各一兩

川芎

黃芩

各二兩

右為粗末每服二錢生薑三片薄荷七葉水煎日二服

雙解散

即防風通聖散益元散二方也

防風

川芎

當歸

白芍藥

薄荷葉

大黃

連翹

各五分

石膏

桔梗

黃芩

各八分

白朮

桂枝

荊芥穗

各二分

甘草

一錢

滑石

二錢四分

時

右剉細加生薑三片水二盞煎至一盞去渣溫服無

葛根橘皮湯 治冬溫未即病春被積寒所折不得發

至夏熱得其寒解冬溫始發肌肉斑爛癰疹如錦紋

而咳心悶但嘔吐清汁服此

葛根

橘皮

去白杏仁

知母

黃芩

麻黃去節甘草炙

右剉散等分每服抄三錢用水一盞同煎半盞去渣溫服不拘時 右四方辛涼之劑表有實熱者宜之

五積散

白芷 川芎各三分 桔梗一分半 芍藥 茯苓

甘草炙 當歸 桂枝 半夏各二分 陳皮五分

枳殼 麻黃各五分 蒼朮一錢 厚朴四分

右除桂枝枳殼二味別為粗末外一十二味剉細慢

火炒令轉色攤冷次入二味末令勻水一盞半薑三片煎至一盞去渣溫服無時

桂枝葛根湯

桂枝 葛根 赤芍藥 升麻 防風

甘草 各一錢

右剉細加生薑三片淡豆豉一錢水一盞煎七分去渣溫服無時

柴葛桂枝湯

柴胡 葛根 甘草 桂枝 防風 人參

白芍藥

各等分

右剉細加生薑三片水一盞煎七分去渣溫服不拘時 右三方辛溫之劑表有寒邪者宜之

攻裏大便酸臭不消化畏食或吐乃內傷飲食宜枳朮

丸傷冷食飲神應丸 紫霜丸

變蒸

神應丸

枳實丸 枳朮丸

俱大科傷食

七物升麻丸

升麻 犀角 黃芩 朴硝 梔子仁

大黃

各二兩

淡豉

二升微炒

右共為末蜜丸如黍米大凡覺四肢大熱大便難即服取微利為止

備急丸

木香

二錢半

大黃

牽牛末

各五錢

右為細末神麴糊丸萊豆大每服五七丸食前山查

煎湯下

和中加味四君子湯

人參 白朮 茯苓 砂仁 橘紅 甘草

各一錢 各五分

右水一鍾煎六分食前溫服

和中散

厚朴 人參 白朮 茯苓 乾薑

薑汁製炒 一錢半

各一錢 炮

甘草

炙各六分

右薑棗煎服

六一例六一散 治諸熱證暫用

桂府滑石

水飛過六兩淨

大甘草

去皮為末一兩

右和勻每用一錢薄荷湯或冷水調下內加製辰砂三錢名辰砂六一散治狂言發搐驚悶用防風荆芥薄荷天麻煎湯候冷調下更加牛黃三錢纏豆藤三錢名退火丹治痘初出時大熱不退及標影稠密成片者用紫草木通蟬退地骨皮紅花牛蒡子片黃芩燈草各等分煎湯候冷調下能減標稀痘極良法也本方加鬱金名牛黃六一散治痘後瘡癰毒壅及天

行瘟疫冷水調下多服大效

大靈丹 治壯熱顛狂驚搐譫語紅紫斑焦乾陷一切

惡證

白滑石

飛過三兩

雄黃

飛過

犀角

各三錢

辰砂

飛過三錢半

牛黃 冰片

各一錢

麝香

五分

右研極細和勻用升麻甘草防風薄荷燈草牛蒡子紅花紫草黃連各三錢水二碗煎至半碗細絹濾去渣加蜜四兩同熬滴水成珠和前藥丸如小龍眼大

金箔為衣每用一九燈心湯下暑月冷水化下

無比散 初熱服之甚能稀痘又治痘夾黑點子及黑

陷黑痘等證

辰砂

錢一

麝香

牛黃

各五分如無牛黃用牛膽南星代之

膩粉

錢二

一方有蟾酥

右研細末一歲兒服一字大者五分刺猪尾血三兩點新汲水調和送下取下惡毒如爛魚腸葡萄穗狀即愈

小無比散 治痘壯熱口渴小水澀大便秘口氣熱煩

躁不寧或焦紫或紅斑自發熱至起壯時有熱者皆

可用痘後餘熱亦可用

桂府滑石

飛過六兩

石膏

飛過一兩

粉草

寒水石

各五錢

鬱金

蟬肚小者甘草湯煮乾為末七錢

右俱製淨末和勻每五歲者服二錢大人再加冬

月燈心湯下 夏月井水調下 熱甚不解者井水

磨犀角汁調下 若紅紫頂陷不起加穿山甲末一

分麝香半分紫草煎湯加酒一二匙調下即起

大無比散 治熱毒太甚驚狂譫語引飲痘瘡紅紫黑

陷

桂府滑石

飛過六兩

粉草

一兩

辰砂

飛過三錢

雄黃

飛過一錢

右為末每三五歲服一錢十歲服二錢發熱之初用敗毒散調下亦能稀痘 若報痘後用燈心湯下

涼血解毒犀角地黃湯

失血

消毒飲

咽喉

玳瑁湯

治時行踈痘瘡及赤瘡疹子未發者令內消

已發者解利毒氣今不太盛

生玳瑁

生犀角

各以冷水濃磨汁二合

右同攪令勻每服半合微溫服一日四五服為佳又治出而未快者宜服之又云毒氣內攻紫黑色出不快用玳瑁水磨濃汁一合入豬心血一皂子大以紫草濃煎湯都作一服服之玳瑁犀角其性微寒以治熱毒則知其無失也二藥皆治瘟疫蠱瘴解百毒通血脈消癰腫故用之以解蘊毒可宜服也

犀角飲子解毒去風疹

犀角

甘草

炙各半兩

防風

二兩

黃芩

一兩

右為粗末每服五錢用水一小盞煎至半盞去渣溫服不拘時候

犀角湯 治小兒疹痘及赤瘡子

犀角

屑

大黃

炒

桑白皮

蜜炙

釣藤

甘草

炙

麻黃

去節各一兩

石膏

五錢

龍膽草

半錢

枯萋

黃耆

炙各半兩

右為粗末每服一錢水一小盞煎至四分去滓溫服

量兒大小加減服瘡子退後濃磨犀角水塗之更良
錢氏亦附方同以此藥治療瘡疹太盛令不入眼則
名調肝散此藥治風盛氣實心肝血熱津液內燥大
便不通毒氣上盛表熱未散之藥也且大黃栝蒡治
內燥釣藤龍胆草治風血熱桑白皮石膏治上焦熱
麻黃黃芪散肌熱犀角甘草解毒大抵用藥貴於與
病相主則病去而正氣自復苟為不然則反為大害
如犀角散自非大便秘數日不通喘急悶亂煩躁譫語

者豈可服之恐病藥不相主治也

奪命散 治瘡疹已發未發並宜服之

升麻

糯米

紫草

甘草

各半

木通

二錢半

右剉為散每服一大錢水七分煎四分去渣溫服出
瘡疹熱毒勢甚者可服解蘊熱利小便瘡痘初熱氣
盛亦宜服

牛蒡散 涼血解毒

右用牛蒡子炒為末水煎一盞服之小兒冬月有非

節之煖及春月天氣暄暖或甘肥之過或重衣溫厚
幃帳周密傷皮膚害血脈瘡瘍發黃是生多疾宜預
常服之也

獨勝散 治小兒發瘡痘早微熱晚大熱目黃脇動身
熱手冷發甚如驚者又名牛蒡殭蚕散

牛蒡子

半兩

白殭蚕

一分

右為粗末每服一大錢水六分盞紫草二七寸同煎
至四分盞連進三服其痘便出此藥用牛蒡子出癰

透肌白殭蚕治遍身癰疹疼痛成瘡為末酒調服之
立瘥又以紫草煎之令利竅是瘡疹證無虛寒證者
服之立出也

解毒疎痘湯 預服解熱去毒已出解熱毒癰疹又治
紅紫口乾壯熱譫語

防風 荊芥 羌活 柴胡 川芎 白芷

當歸 連翹 黃芩 黃連 紫草 蟬退

黍粘子

右薑蔥水煎服

安痲散 調理瘡疹

升麻 赤茯苓 羌活 黃耆 人參

桔梗

炒

枳殼

炒

甘草

各等分

右為細末每服一錢水七分盞紫草薄荷少許同煎至四分盞去渣放溫服之量兒大小增減此藥為解毒涼血生肌寬腸導熱利小便快膈之藥也患瘡疹有熱無寒者可服之

西來甘露飲 清熱解毒如神凡發熱之初五日已前而熱不退痘色紅紫口渴大便結燥服之即能紅潤亦治疹家煩熱口乾咳嗽疹色枯燥或謔語喘急睡卧不安

絲瓜藤

霜降後三日近根二尺剪斷將根頭一節倒挿入新瓦瓶中上以物掩之勿使灰塵

飛入次日以好新罈一隻將瓶中之汁傾在罈中仍將藤照前挿入瓶內三日後汁收盡將罈封固收藏聽後取用

若發熱煩燥口渴未見紅點將茜根一兩水煎濃汁

二酒盃攪絲瓜藤汁二酒盃相和服之立安痘出亦輕若已見標顏色紅紫及稠密者用紫草煎濃湯衝服便見紅潤若夾斑者犀角紫草茜根煎湯衝服寒月用酒煎衝服蓋此汁極能解毒清熱尤治天行時疫每以生薑汁少許加蜂蜜調勻服之有神功

渾元汁

即紫河車不拘男女初胎者尤妙入新瓦罐內封固其口上以碗覆埋於土中久則化而為水是也專治

氣虛血熱痘色紅紫乾枯黑陷等症以此汁清而補之其效立見氣虛甚者人參紫草煎濃湯衝入服之

蟬蛻膏

蟬蛻

去毒

當歸

防風

甘草

川芎

荊芥穗

升麻

各等分

加白芍藥

右為末煉蜜丸如芡實大每服一丸薄荷湯化下

辰砂散

好辰砂

一錢絲辰

近蒂三寸連子燒存性此物發痘瘡最妙

右研末蜜水調服云多者可少少者可無或以紫草
甘草湯調服尤佳


初熱吉凶

發熱時身無大熱腰腹脚膝不痛過三日纔見紅點又
堅硬礙指此為吉證不須服藥

發熱時渾身溫熱不時發驚痘自心經出也乃為吉證
可治而愈 按近年屢有痘前驚而終凶者好事不如
無未可言吉

發熱之初腹中大痛腰如被杖及至報痘乾燥而前痛猶不止者死不治先腹痛後止可用助血氣藥救之初發熱一日遍身即現紅點稠密如蠶種摸過不礙手者死不治

初發熱時頭面一片紅如胭脂者六日後死
初發熱時用紅紙撚蘸油點火照心頭皮肉裏紅如一片胭脂或遍身皆有成塊紅者八九日後死



證治準繩卷八十二